



FICHA DE LA VACUNA INFANRIX

Fecha de revisión: abril 2021

Referencias bibliográficas

Prospecto Información Infanrix (Año 2011) de GlaxoSmithKline.

Tipos de Vacunas

Infanrix, Infanrix-Hib, Infanrix-IPV, Infanrix Hep B, Infanrix-IPV- Hib, Infanrix Hexa, Tetravac, Pentavac y Hexavac.

La vacuna Infanrix Hexa es la más utilizada actualmente en España.

Incluye Difteria, Tétanos, Tosferina, Polio, Hib y Hepatitis B.

Composición Vacuna Infanrix Hexa

- Anatoxina tetánica.
- Anatoxina diftérica.
- Anatoxina tosferina.
- Polisacáridos Hib.
- Ag. virus Hepatitis B.
- Ag. virus Polio.
- Lactosa 12. 600 microgramos.
- Cloruro de sodio 4.500 microgramos.
- Fenoxietanol 2.500 microgramos
- Hidróxido de Aluminio + Fosfato Aluminio, desde 500 microgramos hasta 2.500 microgramos.
- Polisorbato 20 y 80.
- Cloruro de potasio.
- Formaldehído.
- Glicina.
- Antibióticos: neomicina y polimixina.
- Glifosato.

Reacciones adversas postvacunales

- Infecciones como tosferina, haemofilus influenza, polio, difteria, hepatitis e infecciones repetitivas.
- Linfadenopatías.
- Bronquiolitis, Incremento de la mucosidad y Asma.



- Encefalitis: irritabilidad, somnolencia, autismo, TDAH, regresión en la maduración, cambio en el apetito, cambios en la personalidad y en el contacto visual, convulsiones y epilepsia, modificaciones del tono muscular, hipotonía, narcolepsia, apneas y cambio del ritmo sueño- vigilia.
- Eccema, dermatitis atópica, empeoramiento de la psoriasis y urticaria.
- Muerte Súbita.
- Cambios en la coagulación de la sangre.
- Trastornos del metabolismo del hueso.
- Alteraciones digestivas: diarrea, enteritis y colitis.
- Lesión renal e insuficiencia renal.

Observaciones

- La vacunación debe ir precedida de una revisión del historial médico y de un examen clínico.
- Tenga especial cuidado si su hija tiene una enfermedad cerebral no diagnosticada, en evolución descontrolada o presenta convulsiones o ataques cuando tiene fiebre, si presenta claros antecedentes familiares de convulsión o epilepsia.
- Cuidado si su hijo tiene problemas de coagulación.

Sin embargo, los trípticos de los Departamentos de Sanidad y Seguridad Social hacen caso omiso de las observaciones que hacen los fabricantes y sólo nombran la fiebre, la inflamación local y el malestar como efectos adversos.

Fabricantes

GlaxoSmithKline

Aventis Pasteur MSD